

Votre traitement pour la tuberculose latente

Un test cutané à la tuberculine (PPD) ou une prise de sang (quantiféron) a montré que vous êtes infecté par la bactérie qui cause la tuberculose. La bactérie est présente chez vous dans une forme inactive (latente). Vous recevez un traitement avec **l'isoniazide** pour éradiquer cette bactérie et éviter qu'elle s'active chez-vous puis vous rende malade.

Comment prendre les médicaments

- Pour que le traitement soit efficace, il est important de bien prendre toutes les doses pour toute la durée du traitement prescrit.
- Le médicament devrait être pris **1h** avant ou **2h** après un repas pour améliorer leur absorption. Si vous ressentez un inconfort digestif en prenant le médicament, parlez-en à votre médecin. Il pourrait vous recommander de le prendre avec de la nourriture.
- Il ne faut pas prendre d'**alcool** pendant le traitement.
- Il faut limiter la prise d'acétaminophène (Tylénol) à 4 comprimés par jour
- Il est possible que votre médecin vous prescrive de la **pyridoxine** (vitamine B6) pour prévenir des effets indésirables que peut causer l'isoniazide.

Effets indésirables possibles

La majorité des personnes tolèrent bien le traitement. Par contre, vous pourriez ressentir des **maux de cœur**, des **brûlements d'estomac** ou des **maux de tête**. Avisez votre professionnel de la santé si ces symptômes vous incommodent.

Certains effets indésirables pourraient survenir pendant le traitement. Votre médecin prescrira des prises de sang ou des examens pour surveiller leur apparition. Toutefois, il faut **immédiatement contacter** la clinique de tuberculose si vous ressentez ou observez:

- Douleur au ventre, mal de cœur important, vomissements, selles blanches, urine brune, peau ou blanc des yeux qui deviennent jaunes.
- Nouvelle éruption cutanée.
- Brûlures, engourdissements ou fourmillements des mains ou des pieds.
- Fièvre, fatigue ou faiblesse inhabituelle.
- Tout autre symptôme persistant ou inhabituel.

Pour toute question ou si vous ressentez un symptôme anormal, vous pouvez contacter votre professionnel de la santé au _____