

Votre traitement pour la tuberculose

Pour traiter la tuberculose, vous recevez un traitement avec 3 médicaments antituberculeux: la **rifampine**, l'**isoniazide** et la **pyrazinamide**.

Comment prendre les médicaments

- Pour que le traitement soit efficace, il est important de bien prendre toutes les doses pour toute la durée du traitement prescrit.
- Les médicaments devraient être pris **1h** avant ou **2h** après un repas pour améliorer leur absorption. Si vous ressentez un inconfort digestif en prenant les médicaments, parlez-en à votre médecin. Il pourrait vous recommander de les prendre avec de la nourriture.
- Il ne faut pas prendre d'**alcool** pendant le traitement.
- Il faut limiter la prise d'acétaminophène (Tylénol) à 4 comprimés par jour
- Il est possible que votre médecin vous prescrive de la **pyridoxine** (vitamine B6) pour prévenir des effets indésirables que peut causer l'isoniazide.

Effets indésirables possibles

La majorité des personnes tolèrent bien le traitement. Par contre, vous pourriez ressentir des **maux de coeur**, des **brûlements d'estomac**, des **douleurs articulaires** ou des **maux de tête**. Avisez votre professionnel de la santé si ces symptômes vous incommode.

La rifampine cause une coloration **orange-rouge** des larmes, de la salive, de l'urine et de la sueur. Il s'agit d'un effet normal, non dangereux et qui disparaîtra à la fin du traitement. Éviter de porter des lentilles cornéennes pendant le traitement.

Certains effets indésirables pourraient survenir pendant le traitement. Votre médecin prescrira des prises de sang ou des examens pour surveiller leur apparition. Toutefois, il faut **immédiatement contacter** la clinique de tuberculose si vous ressentez ou observez:

- Douleur au ventre, mal de coeur important, vomissements, selles blanches, urine brune, peau ou blanc des yeux qui deviennent jaunes.
- Nouvelle éruption cutanée ou apparition d'ecchymoses (bleus).
- Brûlures, engourdissements ou fourmillements des mains ou des pieds.
- Fièvre, fatigue ou faiblesse inhabituelle.
- Tout autre symptôme persistant ou inhabituel.

Pour toute question ou si vous ressentez un symptôme anormal, vous pouvez contacter votre professionnel de la santé au _____